

MODO DE EMPLEO

- 1- Agitar el frasco de 20 a 30 segundos antes de la aplicación.
 - 2- Después de la profilaxis con piedra pomez secar bien los dientes y aplicar con una torunda de algodón o pincel en las facies vestibular, lingual y oclusal.
- En las partes proximales utilizarse el hilo dental o sonda despuntada.

DURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Con una incidencia de caries media o baja el tratamiento debería repetirse cada seis meses. En caso de un desarrollo de caries más intenso, Duraflur debe administrarse con intervalo de tres meses. Ello se refiere especialmente al tratamiento de zonas de mayor incidencia de caries así como el caso de erupción de molares y en dentición temporal.

TRATAMIENTO DE CUELLOS DENTÁRIOS HIPERSENSIBLES

2 - 3 aplicaciones en intervalos de 3 a 4 días.

PRECAUCIONES

Mantener al abrigo del calor y humedad. Mantener Duraflur fuera del alcance de los niños.

PROPIEDADES

Duraflur es un reconocido de Fluor, que combina un marcado efecto preventivo de caries, con una técnica de aplicación de gran economía de tiempo. Además, Duraflur presenta un fuerte efecto desensibilizante, cuando se aplica en superficies dentinales. Duraflur es especialmente tolerante al agua y cubre incluso los dientes mojados con una bien adherida película de barniz, que se endurece con la saliva posibilitando durante las horas siguientes una penetración de Fluor nunca alcanzada hasta ahora en las más profundas capas de esmalte dental.

CONSEJOS: Método de aplicación

- 1- Si es necesario limpie los dientes con un cepillo rotativo, especialmente los lugares más propicios para ser afectados por caries.
- 2- Primero limpiar el exceso de saliva en uno o dos cuadrantes con la jeringa de aire (o celulosa) e inmediatamente aplicar Duraflur con una torunda de algodón de tamaño adecuado aplicándolo repetidamente para que se forme una fina capa. Seguidamente, tratar los otros cuadrantes de la misma manera.

El color amarillo de Duraflur facilita mucho su aplicación. Después de la aplicación de Duraflur, el paciente puede cerrar la boca inmediatamente. En casos de incidencia elevada de caries y periodontopatía los esfuerzos profilácticos del dentista deben apoyarse con instrucciones generales al paciente sobre el cuidado dental y una dieta adecuada.

Los pacientes no deben comer al menos durante 4 horas, excepto comidas que no deben ser necesariamente masticadas (líquidos). En el día de la aplicación abstenerse de cepillarse los dientes. No deben llevarse a cabo aplicaciones en toda dentición con el estómago vacío. Todos los instrumentos y ropas que hon estado en contacto con Duraflur pueden limpiarse con alcohol.

PLAZO DE VALIDEZ: 3 años.

PRESENTACIONES

Avio conteniendo 01 frasco com 10ml de barniz con fluoreto; 01 pote conteniendo 10g de pedra pomes. 1ml contiene 50mg NaF = 22,6mg F.

USO PROFESIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervé, 86 - Petrópolis - RJ - CEP 25665-010
CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br - Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Registro ANVISA nº 10186370166 - Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999
Industria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por: - DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, Colombia. Mantener



DENTSPLY

DURAFLUR

Verniz com Flúor

GENERALIDADES

Duraflur é um novo conceito de verniz de Flúor que atua de forma marcante no efeito preventivo da cárie, com uma técnica de aplicação de grande economia de tempo. Além disso, Duraflur apresenta um forte efeito dessensibilizante quando se aplica em superfícies dentinárias. Duraflur é especialmente tolerante à água e cobre inclusive os dentes molhados com uma bem aderente película de verniz, que se endurece com a saliva, possibilitando durante as horas seguintes uma penetração de Flúor nunca alcançada antes nas mais profundas áreas do esmalte dental.

COMPOSIÇÃO

Pó (Pedra Pomes): Sacarina Sódica, Pedra Pomes, Aroma Framboesa.

Líquido: Fluoreto de Sódio, Sacarina Sódica, Álcool Anidro, Breu, Goma Laca, Aroma Framboesa.

INDICAÇÕES

- 1- Tratamentos preventivos à cárie dental.
- 2- Tratamento de hipersensibilidade cervical.
- 3- Tratamento preventivo em dentes recém erupcionados e em fósulas e fissuras.
- 4- Tratamento preventivo à cárie secundária após a colocação de obturações, coroas e pontes.
- 5- Para uso como agente remineralizador em lesões tipo mancha branca.
- 6- Para o fortalecimento das estruturas dentais após ajustes oclusais.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Agitar o frasco por 20 a 30 segundos antes do uso;
 - 2- Realizar uma cuidadosa profilaxia com pedra pomes de todos os quadrantes a serem tratados;
 - 3- Lavar com água;
 - 4- Isolar com rolos de algodão o quadrante que será tratado com Duraflur e secar com ar.
 - 5- Aplicar Duraflur com o auxílio de bolinhas de algodão, repetindo o procedimento até que se forme uma película uniforme de verniz. A cor amarelada de Duraflur facilita a visualização das áreas já tratadas.
- Obs.: Para as áreas interproximais, o uso de fio dental ou sondas exploradoras facilitam a aplicação de Duraflur.
- Após a aplicação de Duraflur o paciente pode fechar a boca imediatamente. Os pacientes não devem comer alimentos sólidos nas primeiras quatro horas e também não devem ingerir líquidos nas primeiras duas horas.
- Deve-se recomendar ao paciente para não usar escovas dentais no dia da aplicação e não aplicar em paciente com o estômago vazio.
- Os instrumentos usados para a aplicação de Duraflur, bem como roupa e outros objetos que

acidentalmente entram em contato com o produto, podem ser facilmente limpos com álcool.

- Para os pacientes com baixa ou média incidência de cárie, repetir a aplicação a cada 6 meses.
- Para os pacientes com alta incidência de cárie, principalmente na dentição decídua, repetir a aplicação a cada 3 meses.
- Nos casos de hipersensibilidade cervical, fazer 2 a 3 aplicações em um intervalo de 3 a 4 dias.

CONTRA INDICAÇÕES

Gengivite ulcerosa e estomatite.

REAÇÕES ADVERSAS

Pessoas com tendências alérgicas podem apresentar inflamações edematosas, especialmente depois de aplicações em toda a superfície dental. Em casos muito raros, podem ocorrer ataques de dispnéia em crianças asmáticas. Os pacientes que têm o estômago sensível podem apresentar reações de vômitos ao aplicar doses elevadas sobre grandes superfícies.

Nos casos de intolerância, a capa de verniz pode ser eliminada com facilidade, escovando os dentes e enxaguando.

INTERAÇÃO COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Não se deve administrar outros preparados com alta concentração de Flúor (Gel de Flúor) no mesmo dia da aplicação de Duraflur. Para prevenir acumulação de íon Flúor, a administração regular de comprimidos de Flúor deve ser suspensa durante alguns dias após a aplicação de Duraflur.

DOSE

A menos que tenha sido prescrito de outra forma:

- Para dentição temporária até 0,25 ml (= 5,7mg de íon Flúor)

- Para dentição mista até 0,40 ml (= 9 mg de íon Flúor)

- Para dentição permanente até 0,75 ml (= 17 mg de íon Flúor)

Não se excederão estas quantidades ao aplicar Duraflur em capa fina sobre os lugares de maior incidência de cárie. Deve-se levar em conta que certa quantidade de Duraflur permanecerá nas bolinhas de algodão.

ARMAZENAMENTO

Conservar ao abrigo de calor e umidade .

Manter fora do alcance das crianças.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos.

APRESENTAÇÃO

Embalagem contendo 01 frasco com 10ml de verniz com fluoreto; 01 pote contendo 10g de pedra pomes. 1ml contém 50mg NaF = 22,6mg F.

USO PROFISSIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86 - Petrópolis - RJ - CEP 25665-010
CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br - Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Registro ANVISA nº 10186370166 - Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999
Indústria Brasileira

Importado y Distribuido en Latino América por: - DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661 - CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97

Dentsply Chile Comercial Ltda.

Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile

Dentsply Finance Co. - Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, Colombia. Conserva



“ECONOMIZE ENERGIA.
RECICLAR MATERIAIS
É PRESERVAR
O MEIO AMBIENTE.”

DENTSPLY

DURAFLUR Barniz con Fluor

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Agente de impregnación profunda que contiene Fluor para la profilaxis de la caries dental y para el tratamiento de cuellos dentários sensibles.

COMPOSICIÓN:

Pó (Pedra Pomes): Sacarina Sódica, Pedra Pomes, Aroma Framboesa.

Líquido: Fluoreto de Sódio, Sacarina Sódica, Álcool Anidro, Breu, Goma Laca, Aroma Framboesa.

INDICACIONES

- 1- Profilaxis de la caries por impregnación profunda con Fluor.
- 2- Tratamiento de cuellos dentales hipersensibles.
- 3- Profilaxis contra las caries en dientes recién erupcionados, y en fósulas y fisuras.
- 4- Para evitar la carie marginal secundaria pincelando los bordes de la preparación después de colocar obturaciones, incrustaciones, coronas y puentes.
- 5- Aplicación después de un ajuste oclusal para fortalecer la estructura dental desgastada.
- 6- Para uso como agente remineralizador en lesiones tipo mancha blanca.

CONTRAINDICACIONES

Gingivitis ulcerosa y estomatitis.

REACCIONES ADVERSAS

En personas con tendencias alérgicas, pueden presentarse, ocasionalmente, inflamaciones edematosas especialmente después de aplicaciones en toda la superficie dental.

En casos muy raros pueden ocurrir ataques de dispea en niños asmáticos.

Los pacientes que tienen el estómago sensible pueden reaccionar con vômitos al aplicar dosis elevadas sobre grandes superficies.

CONSEJO

En aquellos casos de intolerancia, la capa de barniz puede eliminarse con facilidad de la boca cepillando y enjuagando.

INTERACCIONES CON OTRAS SUBSTANCIAS

No deben administrarse otros preparados, con alta concentración en íon Fluor (geles de Fluor), el mismo día de la aplicación de Duraflur. Para prevenir la acumulación de íon Fluor la administración regular de comprimidos de íon Fluor debe suspenderse durante varios días después de la aplicación de Duraflur.

DOSES

A menos que se haya prescrito de otra forma:

- Para dentición temporal hasta 0,25ml (= 5,7mg de íon Fluor)

- Para dentición mixta hasta 0,40ml (= 9mg de íon Fluor)

- Para dentición permanente hasta 0,75ml (= 17mg de íon Fluor)

No se excederán estas cantidades si Duraflur se aplica en capa fina sobre los lugares de mayor incidencia de caries. Debe tenerse en cuenta que cierta cantidad de Duraflur permanecerá en la torunda de algodón, etc.